

# **APATHY DIAGNOSTIC CRITERIA 2018**

**ENGLISH VERSION**

**VERSION FRANÇAISE**

**APPENDIX**

CRITERION A	Yes	No
A quantitative reduction of goal-directed activity either in behavioral, cognitive, emotional or social dimensions in comparison to the patient's previous level of functioning in these areas. These changes may be reported by the patient himself/herself or by observation of others.		

CRITERION B
-------------

B1. BEHAVIOUR & COGNITION	Yes	No
Loss of, or diminished, goal-directed behaviour or cognitive activity as evidenced by at least one of the following:		
<b>General level of activity:</b> the patient has a reduced level of activity either at home or work, makes less effort to initiate or accomplish tasks spontaneously, or needs to be prompted to perform them.		
<b>Persistence of activity:</b> He/she is less persistent in maintaining an activity or conversation, finding solutions to problems or thinking of alternative ways to accomplish them if they become difficult.		
<b>Making choices:</b> He/she has less interest or takes longer to make choices when different alternatives exist (e.g. selecting TV programs, preparing meals, choosing from a menu)		
<b>Interest in external issue:</b> He/she has less interest in or reacts less to news, either good or bad, or has less interest in doing new things		
<b>Personal wellbeing:</b> He/she is less interested in his/her own health and wellbeing or personal image (general appearance, grooming, clothes, etc.)		

B2. EMOTION	Yes	No
Loss of, or diminished emotion as evidenced by at least one of the following:		
<b>Spontaneous emotions:</b> the patient shows less spontaneous (self-generated) emotions regarding their own affairs, or appears less interested in events that should matter to him/her or to people that he/she knows well.		
<b>Emotional reactions to environment:</b> He/she expresses less emotional reaction in response to positive or negative events in his/her environment that affect him/her or people he/she knows well (e.g., when things go well or bad, responding to jokes, or events on a TV program or a movie, or when disturbed or prompted to do things he/she would prefer not to do).		
<b>Impact on others:</b> He/she is less concerned about the impact of his/her actions or feelings on the people around him/her.		
<b>Empathy:</b> He/she shows less empathy to the emotions or feelings of others (e.g., becoming happy or sad when someone is happy or sad, or being moved when others need help).		
<b>Verbal or physical expressions:</b> He/she shows less verbal or physical reactions that reveal his/her emotional states.		

<b>B3. SOCIAL INTERACTION</b>	Yes	No
Loss of or diminished, engagement in social interaction as evidenced by at least one of the following:		
<b>Spontaneous social initiative:</b> the patient takes less initiative in spontaneously proposing social or leisure activities to family or others.		
<b>Environmentally stimulated social interaction:</b> He/she participates less, or is less comfortable or more indifferent to social or leisure activities suggested by people around him/her.		
<b>Relationship with family members:</b> He/she shows less interest in family members (e.g., to know what is happening to them, to meet them or make arrangements to contact them).		
<b>Verbal interaction:</b> He/she is less likely to initiate a conversation, or he/she withdraws soon from it.		
<b>Homebound:</b> He / She prefer to stays at home more frequently or longer than usual and shows less interest in getting out to meet people		

<b>CRITERION B</b>	Yes	No
The presence of at least 2 of the 3 dimensions ( <b>B1, B2, B3</b> ) for a period of at least four weeks and present most of the time		

<b>CRITERION C</b>	Yes	No
These symptoms (A - B) cause clinically significant impairment in personal, social, occupational, or other important areas of functioning.		

<b>CRITERION D</b>	Yes	No
The symptoms (A - B) are not exclusively explained or due to physical disabilities (e.g. blindness and loss of hearing), to motor disabilities, to a diminished level of consciousness, to the direct physiological effects of a substance (e.g. drug of abuse, medication), or to major changes in the patient's environment.		

<b>APATHY DIAGNOSIS</b>	Yes	No
Positive if criteria A, B, C and D are present.		

CRITÈRE A	Oui	Non
Il existe une réduction quantifiable de l'activité dirigée vers un but par rapport à l'état précédent de fonctionnement du patient dans les domaines soit des comportements / cognition, des émotions ou des interactions sociales. Ces changements peuvent être rapportés par le patient lui-même ou l'observation extérieure.		

CRITÈRE B	Oui	Non
<b>B1. COMPORTEMENT &amp; COGNITION</b> Perte ou diminution des comportements dirigés vers un but et de l'activité cognitive mis en évidence par la présence d'un des aspects suivants :		
<b>Niveau d'activité général</b> : Le patient présente une réduction du niveau d'activité à la maison soit au domicile ou au travail, fournit moins d'efforts pour initier ou accomplir des tâches de manière spontanée, ou a besoin d'être incité pour les réaliser.		
<b>Persistante des activités</b> : Il/Elle persiste moins dans le maintien d'une activité ou d'une conversation, dans la recherche de solutions à un problèmes ou dans l'élaboration de voies alternatives pour les résoudre lorsqu'elles ils deviennent difficiles.		
<b>Prendre des décisions</b> : Il/Elle a moins d'intérêt et prend plus de temps pour prendre des décisions quand différentes alternatives existent. (par ex pour choisir des programmes tv, préparer des repas, choisir un menu, etc.)		
<b>Intérêt pour des enjeux externes</b> : Il/Elle a moins d'intérêt, réagit moins aux nouvelles quelles soit bonnes ou mauvaises ou à moins d'intérêt pour faire de nouvelles activités		
<b>Bien-être personnel</b> : Il/Elle s'intéresse moins à sa santé et son bien-être ou à son image (apparence générale, toilette, habits, etc.)		

B2. EMOTION	Oui	Non
Perte ou diminution des émotions mises en évidence par au moins un des aspects suivants :		
<b>Emotions spontanées</b> : Il/Elle montre moins d'émotions spontanées (auto-générée) pour ses propres affaires, ou semble moins intéressé par des événements qui devraient l'affecter ou affecter ses proches.		
<b>Réactions émotionnelles face à l'environnement</b> : Il/Elle exprime moins de réactions en réponse à des évènements positifs ou négatifs dans son environnement qui le/la touchent directement ou les personnes qu'il/Elle connaît bien (répond à une blague, à des informations à la TV ou aux scènes d'un film, ou quand Il/Elle est perturbé ou incité à effectuer des tâches déplaisantes).		
<b>Impact sur autrui</b> : Il/Elle est moins concerné par l'impact de ses actions ou de ses sentiments ou de ses sentiments envers les personnes qui l'entourent.		
<b>Empathie</b> : Il/Elle a moins d'empathie envers les émotions ou sentiments de l'autre (être heureux ou triste quand l'autre est heureux ou triste ou inversement, triste quand l'autre est triste, ou être touché émotionnellement quand une personne a besoin d'aide)		
<b>Expression verbales ou physiques</b> : Il/Elle montre moins de réactions verbales ou physiques qui indiquent son ressenti émotionnel.		

<b>B3. INTERACTIONS SOCIALES</b>	Oui	Non
Perte ou diminution de l'engagement dans des interactions sociales mises en évidence par au moins un des aspects suivants :		
<b>Initiatives sociales spontanées :</b> Le patient prend spontanément moins d'initiatives pour proposer des activités sociales ou de loisir à sa famille ou autres.		
<b>Interactions sociales stimulées par l'environnement :</b> Il/Elle participe moins ou est moins à l'aise ou plus ou est indifférent aux activités, sociales ou de loisirs, proposées par son entourage.		
<b>Relations avec les proches :</b> Il/Elle s'intéresse moins aux membres de la famille ( par ex savoir ce qu'il leur arrive, les voir ou les contacter)		
<b>Interactions verbales :</b> Il/Elle initie moins ou n'initie plus de conversation, ou l'interrompt précocement.		
<b>Domicile:</b> Il/Elle préfère rester chez lui/elle plus fréquemment ou plus longuement que d'habitude et s'intéresse moins à sortir pour voir ses proches ou ses amis.		

<b>CRITERE B - Resumé</b>	Yes	No
La présence d'au moins 2 de ces 3 dimensions( <b>B1, B2, B3</b> ) la plupart du temps durant les 4 dernières semaines		

<b>CRITÈRE C</b>	Oui	Non
Les critères A et B causent une altération cliniquement significative des occupations personnelles et sociales, ou d'autres aspects importants du fonctionnement.		

<b>CRITÈRE D</b>	Oui	Non
Les symptômes A et B ne sont pas exclusivement causés par un handicap physique (céphalgie ou surdité), un handicap moteur, une diminution du niveau de conscience, des effets directs d'une substance (drogues illicites ou traitement), ou de changements majeurs de l'environnement du patient.		

<b>DIAGNOSTIC DE L'APATHIE</b>	Oui	Non
Positif si les critères A, B, C and D sont présent present.		

## APPENDIX

### **Definition:**

Goal-directed behaviour/ activity: behaviour aimed toward a goal or toward completion of a task Presumed underlying pathophysiological mechanisms: Apathy is the clinical consequence of various underlying dysfunctions of mental and biological processes required to elaborate, initiate and control intentional/goal-directed behaviour.

## How to assess apathy

### Interviews for caregiver

AES-I, NPI, IAS, FrSBe, IA, DAIR, KBCI, LARSi, DAS, APADEM-NH

### Self report index

AES-S, The Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome, FrSBe, EDA, NPI-C, DAS, AMI

### Clinician's scales

BPRS, PANSS, SANS, AES-C, UPDRS, The Behavioural Assessment of Dysexecutive Syndrome, IAS, FrSBe, IA, DAIR, LARS, sFLARS, NPI-C

*Cautions: Due to anosognosia, take with caution patient's report. Select a good caregiver; take into account spouse's biases etc. It is possible in parallel to use other types of scales / assessment tools (eg for depression, anxiety, fatigue..)*

## Information and Communication technologies (ICT)

There is evidence that apart from the currently used assessment methods for apathy, new ICT approaches could provide clinicians with valuable additional information for detection and therefore more accurate diagnosis of apathy. Actigraphy and methods used to monitor motor activity and rest-activity rhythms had already demonstrated to be accurate and related to apathy. Other methodologies (voice analysis, video analysis, use of serious games) already are used but only at the moment in research setting.

*Caution: Such technologies must be used and interpreted with caution in patients with movement disorders (Parkinson's disease, Huntington's disease, progressive supranuclear palsy,...). These patients often have reduced total activity, in relation with their motor symptoms. In the same way, they speak slowly, with an hypophonic voice, have a low speech rate due to speech and respiratory disorders. They also have an hypomimic face that can give the impression they do not react to emotion while it is not really the case. Hence, the proposed measures need to be used with reservations. What is needed for pharmacological clinical trials - To provide the scientific rational (biological basis) for targeting specific dimensions; - To provide the relation with the product intended for development (mechanism of action); To provide justification for the choice of endpoint.*

*The criteria are presented in: European Psychiatry 54 (2018) 71–76*

The supplements (table 1,2,3) are included below